



## Vogelzählung 2025

### Ganzjahres-Bestandsaufnahme





## Brutvogelvorkommen im Duvenseer Moor und umgebenden Niederungsbereichen in der Brutsaison 2025

Stefanie Ismar-Rebitz und Bernd Koop

**Tabelle 1:** Begehungszeitraum für die Brutvogelkartierung  
Brutvogelkartierung 2025

|            |                       |      |
|------------|-----------------------|------|
| 21.03.2025 | Stefanie Ismar-Rebitz | 7:30 |
| 21.03.2025 | Bernd Koop            | 3:30 |
| 03.04.2025 | Stefanie Ismar-Rebitz | 8:45 |
| 09.04.2025 | Bernd Koop            | 3:30 |
| 22.04.2025 | Stefanie Ismar-Rebitz | 8:00 |
| 22.04.2025 | Bernd Koop            | 3:30 |
| 23.04.2025 | Stefanie Ismar-Rebitz | 4:30 |
| 08.05.2025 | Bernd Koop            | 3:30 |
| 09.05.2025 | Stefanie Ismar-Rebitz | 7:30 |
| 23.05.2025 | Stefanie Ismar-Rebitz | 6:00 |
| 28.05.2025 | Bernd Koop            | 3:30 |
| 20.06.2025 | Stefanie Ismar-Rebitz | 8:45 |
| 11.07.2025 | Stefanie Ismar-Rebitz | 6:30 |
| 19.07.2025 | Nora Wuttke           | 6:30 |
| 01.08.2025 | Bernd Koop            | 3:30 |
| 30.08.2025 | Stefanie Ismar-Rebitz | 3:30 |



# Untersuchungsgebiet Duvensee Niederung

## Ergebnisse

Insgesamt **46** Brutvogelarten punktgenau erfasst und ihre Brutzeitvorkommen ausgewertet.  
davon **17** Arten der aktuellen Roten Listen Deutschlands und/oder S-H  
und **8** weitere Arten der Vorwarnlisten.

**12** weitere Allerweltsarten wurden mit Brutzeitcodes, Revierzahlen und Häufigkeiten

Kategorie 2 - stark gefährdet

Birkhuhn (1)  
Braunkiebitz  
Dreischnitzler (X)  
Feldschwirl (3)  
Flussseeschwalbe  
Flussuferläufer  
Grauspecht  
Haselhuhn  
Kiebitz  
Nachtreiher



Birkhuhn-Indo - Foto: Melanie Busch-Finn  
www.naturgoe.de

Ornitor (3)  
Rebhuhn  
Rotschenkel (3)  
Spießente (3)  
Turteltaube  
Weißrückenspecht  
Wiesenspeyer  
Wiesenvogel



Spießente - Foto: Frank Dier

## „Diskussion

Die Duvenseeniederung hat eine besondere Funktion als periodisch überschwemmtes Flachgewässer in einer ausgedehnten Moorniederung.

**Solche Lebensräume sind in Schleswig-Holstein sehr selten geworden**

...



## Rote Liste

### **International Union for Conservation of Nature and Natural Resources**

1948 gegründet, ist die weltweit größte Naturschutzorganisation  
Dachverband aus Regierungen und NGOs für den Erhalt der biologischen Vielfalt  
einsetzt.


**Bekannt vor allem für die Herausgabe der Roten Liste gefährdeter Arten**



# Rote Liste der Vogelarten

| Art                |                                | Bestand 2025 |
|--------------------|--------------------------------|--------------|
| Amsel              | <i>Turdus merula</i>           | 5            |
| Bachstelze         | <i>Motacilla alba</i>          | 6            |
| Blaumeise          | <i>Cyanistes caeruleus</i>     | 8            |
| Buchfink           | <i>Fringilla coelebs</i>       | 7            |
| Buntspecht         | <i>Dendrocopus major</i>       | 3            |
| Dorngrasmücke      | <i>Sylvia communis</i>         | 6            |
| Eichelhäher        | <i>Garrulus glandarius</i>     | 2            |
| Elster             | <i>Pica pica</i>               | 1            |
| Erlenzeisig        | <i>Carduelis spinus</i>        | 3            |
| Feldsperling       | <i>Passer montanuns</i>        | 2            |
| Fitis              | <i>Phylloscopus trochylus</i>  | 2            |
| Gartenbaumläufer   | <i>Certhia brachydactyla</i>   | 3            |
| Gartengrasmücke    | <i>Sylvia borin</i>            | 5            |
| Gelbspötter        | <i>Hippolais icterina</i>      | 3            |
| Gimpel             | <i>Pyrrhula pyrrhula</i>       | 3            |
| Grünfink           | <i>Carduelis chloris</i>       | 4            |
| Grünspecht         | <i>Picus viridis</i>           | 1            |
| Heckenbraunelle    | <i>Prunella modularis</i>      | 5            |
| Jagdfasan          | <i>Phasianus colchicus</i>     | 6            |
| Klappergrasmücke   | <i>Sylvia curruca</i>          | 2            |
| Kleiber            | <i>Sitta europaea</i>          | 4            |
| Kohlmeise          | <i>Parus major</i>             | 17           |
| Misteldrossel      | <i>Turdus viscivorus</i>       | 1            |
| Mittelspecht       | <i>Dendrocopus medius</i>      | 1            |
| Mönchsgrasmücke    | <i>Sylvia atricapilla</i>      | 10           |
| Rabenkrähen        | <i>Corvus corone</i>           | 6            |
| Ringeltaube        | <i>Columba livia</i>           | 9            |
| Rotkehlchen        | <i>Erithacus rubecula</i>      | 5            |
| Schwanzmeise       | <i>Aegithalos caudatus</i>     | 2            |
| Singdrossel        | <i>Turdus philomelos</i>       | 3            |
| Sommergoldhähnchen | <i>Regulus ignicapilla</i>     | 1            |
| Stieglitz          | <i>Carduelis carduelis</i>     | 12           |
| Sumpfrmeise        | <i>Poecile pallustris</i>      | 6            |
| Tannenmeise        | <i>Periparus ater</i>          | 1            |
| Zaunkönig          | <i>Troglodytes troglodytes</i> | 8            |
| Zilpzalp           | <i>Phylloscopus collybita</i>  | 21           |

## Einstufungsschema



## Kategorie 2 - stark gefährdet

- Birkhuhn (1)
- Braunkehlchen
- Dreizehenmöwe (R)
- Feldschwirl (3)
- Flussseeschwalbe
- Flussuferläufer
- Grauspecht
- Haselhuhn
- Kiebitz
- Nachtreiher


- Ortolan (3)
- Rebhuhn
- Rotschenkel (3)
- Spießente (3)
- Turteltaube
- Weißrückenspecht
- Wiesenpieper
- Wiesenweihe

Duvenseeniederung

Brutvorkommen

aller punktgenau verzeichneten Arten

| Art               | Listenstatus |       | Bestand   |                     |            |
|-------------------|--------------|-------|-----------|---------------------|------------|
|                   | RL-D         | RL-SH | Niederung | umgebendes Grünland | Klärteiche |
| Knäkente          | 1            | 2     | 3         |                     |            |
| Löffelente        | 3            |       | 3         |                     | 1          |
| Schnatterente     |              |       | 2         |                     | 1          |
| Stockente         |              |       | 3         |                     | 2          |
| Brandgans         |              |       | 4         |                     | 1          |
| Graugans          |              |       | 5         |                     |            |
| Höckerschwan      |              |       | 1         |                     |            |
| Rothalstaucher    |              |       | 1         |                     |            |
| Zwergtaucher      |              |       | 2         |                     |            |
| Blässhuhn         |              | V     | 3         |                     |            |
| Teichhuhn         | V            |       | 3         |                     | 1          |
| Kranich           |              |       | 3         |                     |            |
| Wasserralle       | V            |       | 1         |                     |            |
| Tüpfelsumpfhuhn   | 3            | 2     | 0         |                     |            |
| Wachtelkönig      | 1            | 2     | 2         |                     |            |
| Bekassine         | 1            | 1     | 3         |                     |            |
| Flussregenpfeifer | V            |       | 1         |                     |            |
| Kiebitz           | 2            | 3     | 28        | 7                   |            |
| Wachtel           | V            | 3     | 6         | 1                   |            |
| Rebhuhn           | 2            | 2     | 3         | 1                   |            |
| Schilfrohrsänger  |              |       | 3         |                     |            |
| Sumpfrohrsänger   |              |       | 14        |                     | 4          |
| Rohrhammer        |              |       | 19        |                     | 1          |
| Grauammer         |              | 3     | 3         |                     |            |
| Goldammer         |              |       | 10        |                     |            |
| Neuntöter         |              |       | 21        | 1                   | 1          |
| Blaukehlchen      |              |       | 3         |                     |            |
| Schwarzkehlchen   |              |       | 14        |                     |            |
| Braunkehlchen     | 2            | 2     | 1         |                     |            |




Duvenseeniederung

Allerweltsarten  
Häufigkeiten der  
Brutzeitvorkommen

| Art              | Listenstatus |       | Bestand   |                        |            |
|------------------|--------------|-------|-----------|------------------------|------------|
|                  | RL-D         | RL-SH | Niederung | umgebendes<br>Grünland | Klärteiche |
| Bluthänfling     | 3            |       | 2         | 6                      |            |
| Schafstelze      |              |       | 24        | 1                      | 1          |
| Feldlerche       | 3            | 3     | 25        | 2                      | 1          |
| Wiesenpieper     | 2            | V     | 15        |                        |            |
| Baumpieper       | V            |       | 1         | 6                      |            |
| Pirol            | V            |       | 2         |                        |            |
| Star             | 3            | V     | 6         | 3                      |            |
| Gartenrotschwanz | V            |       | 4         |                        |            |
| Trauerschnäpper  |              | 2     | 1         |                        |            |
| Grauschnäpper    |              | 3     | 2         | 1                      |            |
| Nachtigall       |              |       | 2         |                        |            |
| Sprosser         | V            | 3     | 1         |                        |            |
| Kuckuck          | V            | V     | 3         |                        |            |
| Waldkauz         |              |       | 1         |                        |            |
| Eisvogel         |              |       | 1         |                        |            |
| Kleinspecht      | 3            | V     | 1         |                        |            |
| Rotmilan         |              |       | 2         |                        |            |
| Weißstorch       | V            | 3     | 0         |                        |            |

# Bekassine



## Bestand [\[ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten \]](#)

Die Bekassine wird von der [IUCN](#) als nicht bedroht („least concern“) eingestuft.<sup>[14]</sup> Der europäische Gesamtbestand wird auf 930.000 bis 1.900.000 Brutpaare geschätzt. Hohe [Populationsdichten](#) in Europa erreicht die Bekassine in [Russland](#), dem [Baltikum](#), [Skandinavien](#) und dem östlichen [Mitteleuropa](#). Größere Bestände gibt es auch noch auf den [Britischen Inseln](#) und im Bereich der [Nordsee](#). In [Westeuropa](#) und im [Mittelmeerraum](#) kommt die Bekassine zerstreuter vor. Der mitteleuropäische Brutbestand wird zu Beginn des 21. Jahrhunderts auf 24.000 bis 45.000 Brutpaare geschätzt.<sup>[15]</sup>

In [Deutschland](#) gilt die Bekassine laut [Roter Liste der Brutvögel Deutschlands](#) 2020 als vom Aussterben bedroht.<sup>[16]</sup> Noch Mitte des

# Braunkehlchen



Weibchen von der Seite



Nachteilig: intensive Grünlandnutzung ( Bodenbrüter)

Wichtig: Nahrungsquellen Wiesenflächen

Gefahr: freilaufende Hunde stören das Brutgeschäft / Jungtiere eine leichte Beute für Hauskatzen

# Trauerschnäpper



Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*), Weibchen



Verbreitung des Trauerschnäppers:

 Brutgebiete

 Migration

 Überwinterungsgebiete

## Bestand und Gefährdung [\[ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten \]](#)

Der Brutbestand in Deutschland wird für die Zeit von 2005 bis 2009 auf 70.000 bis 135.000 Brutpaare geschätzt. In der [Roten Liste der Brutvögel Deutschlands](#) von 2015 wird die Art in der Kategorie 3 als gefährdet geführt.<sup>[3]</sup>

# Knäkente



## Gefährdung

Die Knäkente ist vom Aussterben bedroht. Die verbliebenen Auen und Feuchtwiesenlebensräume reichen der Art nicht für Bestandszunahmen.

## Nahrung

Die Knäkente frisst gern Insekten, Krebse, Würmer und Schnecken, aber auch hin und wieder Sämereien und Wasserpflanzen.

## Zugverhalten

Von April bis September brüten Knäkten im nördlichen und östlichen Europa. Im Winter ziehen sie nach Afrika und überqueren sogar die Sahara. Östliche Knäkten überwintern auch in Indien.

# Wachtelkönig



Der Wachtelkönig ist in der [Roten Liste](#) der Brutvögel Deutschlands als vom Aussterben bedroht eingestuft.<sup>[7]</sup>

Die Bestandssituation dieser Art muss sehr differenziert betrachtet werden. In Mitteleuropa gingen die Bestände zum Teil rapide zurück, erholen sich aber seit etwa 10 Jahren leicht oder bleiben zumindest stabil. [Lebensraumzerstörung](#) durch weiträumige Trockenlegungen ehemaliger Feuchtgebiete, Vorverlegung der Mähtermine und weitflächige, schnell vollzogene maschinelle Mahd waren für diese Entwicklung maßgebend. Dazu kommen verstärkt im letzten Jahrzehnt sehr starke Beeinträchtigungen in den Überwinterungsgebieten, hervorgerufen vor allem durch Umweltveränderungen und [Pestizideintrag](#). Auch die Verluste während des Zuges, teils durch Nachstellungen, teils durch Unfälle (Hochspannungsleitungen), sind beträchtlich. Weniger negativ scheint dieser Trend in Nordwesteuropa und Skandinavien zu sein.

# Wichtige Lebensraumfaktoren für Vögel:



- **Nahrungsverfügbarkeit:**

Eine ausreichende Quelle für Nahrung wie Insekten, Samen, Früchte oder Beutetiere ist essenziell. Hecken, Bäume und Sträucher sind wichtige Nahrungsquellen

- **Nistplätze und Unterschlupf:**

Strukturreiche Lebensräume wie Hecken, Büsche, Bäume, Felsen oder Schilfflächen dienen als Schutz vor Feinden und als Nistmöglichkeit

- **Wasserressourcen**

Feuchtgebiete sind von großer Bedeutung, da sie Wasser und spezifische Lebensbedingungen für viele Vogelarten, wie Reiher und Enten, bieten

- **Strukturvielfalt:**

Eine enge Verzahnung von offenen Flächen (Wiesen, Weiden, Äcker) und bewachsenen Bereichen (Hecken, Waldränder) ist für viele Arten, wie den Neuntöter, entscheidend

- **Ruhezonen:**

Ungestörte Bereiche sind wichtig, um Energie zu sparen, insbesondere während der Brutzeit oder für Zugvögel

# Gefahren



## Vogelzug

Zugvögel erleiden auf ihren Reisen massive Verluste, oft überleben nur etwa 30 % der gestarteten Tiere.

- Schwindende Rast- und Überwinterungsgebiete
- illegale Jagd
- Nahrungsmangel und extreme Wetterbedingungen erhöhen die Sterblichkeit.
- Lichtverschmutzung:
- Erschöpfung: Nahrungsmangel oder verdursten auf dem Flug über Meere und Wüsten.

## Katzen als Feinde der Vögel

- **Hohe Mortalität:** In Deutschland töten geschätzte 15 bis 16 Millionen Hauskatzen jährlich etwa **200 Millionen Vögel**
- **Hauptgefahr:** Hauskatzen und verwilderte Hauskatzen stellen eine bedeutende Bedrohung für die heimische Vogelwelt dar
- **Brutzeit:** Besonders gefährlich ist die Zeit zwischen April und August, wenn Jungvögel flügge werden (Ästlingsphase)

## Vogelfalle Glas

Vögel erkennen **Glasflächen nicht als Hindernis**

Schätzungsweise über **100 Millionen Vögel** in Deutschland sterben im Zusammenhang mit einem Aufprall gegen Fenster

